

# ЭФФЕКТЫ

## ОСНОВНЫХ ОБ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

### ХЛОРБЕНЗИЛДЕНМАЛОДОНОДИНИТРИЛ (CS)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ЛАКРИМАТОР

ЗАПАХ: ПЕРЕЧНО-ЖГУЧИЙ



Торговые названия: «Сирень», «Кобра», «Рефлекс».

#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОВ:

10 минут после прекращения контакта с раздражителем, зуд от 45 до 60 минут.

#### СУБЪЕКТИВНО:

Боль, временная слепота, паника жжение, зуд.

#### ОБЪЕКТИВНО:

Слезотечение, инъекция сосудов конъюнктивы, иногда блефароспазм, в 5–10% случаев светобоязнь, раздражение слизистых, аллергический контактный дерматит.

### ХЛОРАЦЕТОФЕНОН (CN)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ЛАКРИМАТОР

ЗАПАХ: ЯБЛОЧНЫЙ



Торговые названия: «Черёмуха».

#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОВ:

Длительно.

#### СУБЪЕКТИВНО:

Жжение и боль в горле, затруднённое дыхание, зуд.

#### ОБЪЕКТИВНО:

Может вызывать ожог и помутнение роговицы, зрелия роговицы, на коже ожоги с образованием волдырей, раздражение слизистых, аллергический контактный дерматит.

### АДАМСИТ (DM)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: СТЕРИТИ

ЗАПАХ: ОТСУТСТВУЕТ



#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОВ:

2 часа.

#### СУБЪЕКТИВНО:

Зудшие, сильная боль на месте контакта с раздражителем, загрудинные боли, жжение, зуд.

#### ОБЪЕКТИВНО:

Рвота, сильное психомоторное возбуждение, инъекция сосудов слизистой оболочки зева, гиперемия гортани и полости носа.

### КАПСАИЦИН (OC)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ЛАКРИМАТОР

ЗАПАХ: ПЕРЕЧНО-ЖГУЧИЙ



Торговое название: «Дракон», «Шлага», «Жгучий перчик», «Факел».

#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОВ:

15–30 минут утрата способности к координированным действиям, зуд от 45 до 60 минут, потеря голоса до 20 минут; рвота до нескольких дней.

#### СУБЪЕКТИВНО:

Слезотечение, временная слепота, зуд, жжение, зудшие.

#### ОБЪЕКТИВНО:

Кератит, ринорея, хрипота, сухой кашель, рвота; у людей, страдающих астмой может случиться приступ, угрожающий жизни.

### ДИБЕНЗОКСАЗЕПИН (CR)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ЛАКРИМАТОР

ЗАПАХ: ОТСУТСТВУЕТ



#### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОВ:

10–15 минут утрата способности к координированным действиям.

#### СУБЪЕКТИВНО:

Боль, временная слепота, зуд жжение.

#### ОБЪЕКТИВНО:

Инъекция сосудов конъюнктивы, отек век, блефароспазм, обильное слезотечение, повышение АД.