


ПРИВИВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 7 ЛЕТ: РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2017 ГОД

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ



На сером фоне указан возрастной диапазон, когда должна быть введена прививка

Примечания:

* Две дозы с перерывом в 4 недели для детей возрастом от 6 месяцев до 8 лет, если они получают вакцину впервые, и для некоторых групп детей того же возраста по рекомендации врача.

** Две дозы с интервалом в 3 месяца для детей с 9 месяцев, либо одна доза для детей от 2 лет и старше. Ревакцинация через 5-7 лет.

Обратите внимание:

- 1 Если ваш ребенок пропустил прививку, вам не нужно начинать все с начала — приходите на следующий прием к своему врачу. Если у вас есть вопросы о вакцинации — задайте их своему педиатру.
- 2 Если у ребенка есть какие-либо заболевания, которые создают риск инфекции, или он покидает территорию России — поговорите с педиатром о дополнительных прививках, которые могут понадобиться.
- 3 Вакцина против клещевого энцефалита (ТБЕ — Tick-Borne Encephalitis) применяется для эндемичных регионов, по согласованию с педиатром. Схема вакцинации: 1-ая доза по назначению, 2-ая через 1-3 месяца, 3-я через 9-12 месяцев. Ревакцинация по одной дозе раз в 3-5 лет.

БЦЖ - вакцина против туберкулеза
 ВГВ - вакцина против гепатита В
 ИПВ - инактивированная полиомиелитная вакцина
 БОПВ - бивалентная оральная полиомиелитная вакцина
 ПКВ - пневмококковая конъюгированная вакцина (Превенар 13 или Синфлорикс)

АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина
 АДСм - вакцина против столбняка и дифтерии
 КПК - вакцина против кори, паротита, краснухи
 RotaV - вакцина против ротавируса
 Hib - вакцина против гемофильной инфекции типа В
 MenACWY - вакцина против менингококковой инфекции